

Инструкция рассмотрена и одобрена
на Ветбиофармсовете
«14» 05 2010 г.
Протокол № 53

ИНСТРУКЦИЯ по применению препарата «АИНИЛ»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1 Аинил (AiniL).
- 1.2 Аинил – нестероидный противовоспалительный препарат, представляющий собой прозрачный раствор с желтоватым оттенком.
В 1,0 см³ препарата содержится 100,0 мг кетопрофена.
- 1.3 Препарат выпускают во флаконах по 10, 20, 50 и 100 см³.
- 1.4 Аинил хранят по списку Б в упаковке изготовителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от плюс 5⁰С до плюс 25⁰С.
Срок годности – 2 (два) года от даты изготовления. Срок хранения открытого флакона – 7 дней.

2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- 2.1 Кетопрофен – нестероидное противовоспалительное средство, производное пропионовой кислоты. Оказывает противовоспалительное, обезболивающее и жаропонижающее действия, подавляет агрегацию тромбоцитов.
- 2.2 Механизм действия. Воздействуя на циклооксигеназное и липооксигеназное звенья метаболизма арахидоновой кислоты, кетопрофен ингибирует синтез простагландинов, лейкотриенов и тромбоксанов. Обладает центральным и периферическим анальгезирующим действием, мощной антибрадикалининовой активностью, стабилизирует лизосомальные мембраны, вызывает значительное торможение активности нейтрофилов у больных ревматоидным артритом.
- 2.3 Кетопрофен хорошо всасывается из места введения и быстро распространяется в организме. Препарат частично метаболизируется в печени, выводится в основном с мочой.

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

- 3.1 Аинил применяют крупному рогатому скоту в качестве противовоспалительного, болеутоляющего и жаропонижающего средства для лечения воспалительных процессов, связанных с заболеваниями органов дыхания, при отеке молочной железы, остром течении мастита, воспалении скелетной мускулатуры.
- Свиньям – в качестве противовоспалительного, болеутоляющего и жаропонижающего средства при синдроме Метрит-Мастит-Агалактия, воспалительных процессах опорно-двигательного аппарата и респираторных инфекциях.
- Лошадям – при лечении воспалительных и болезненных состояний костно-суставных и скелетно-мышечных систем, в частности: хромота травматического происхождения, артрит, артроз, травмы суставов (растяжение, синовит), трещины, тендинит, заболевания стоп (болезнь ладьевидной кости, травмы из-за подков, пододерматит), воспаления после операций. Симптоматическое лечение колик.
- 3.2 *Крупному рогатому скоту* препарат вводят внутривенно или внутримышечно, в дозе 3 мл на 100 кг живой массы (по препарату) или 3 мг на 1 кг живой массы (по АДВ) 1 раз в сутки, в течение 1-3 дней.
- Свиньям* препарат вводят внутримышечно в дозе 3 мл на 100 кг живой массы (по препарату) или 3 мг на 1 кг живой массы (по АДВ) 1 раз в сутки, в течение 1-3 дней.

Лошадям препарат вводят внутривенно в дозе 1 мл на 45 кг живой массы (по препарату) или 2,2 мг на 1 кг живой массы (по АДВ) 1 раз в сутки, в течение 3-5 дней. При симптоматическом лечении колик – 1 мл на 45 кг живой массы (по препарату) или 2,2 мг на 1 кг живой массы (по АДВ) однократно.

3.3 Применение препарата противопоказано животным с почечной недостаточностью.

3.4 Побочное действие. Иногда после внутримышечного введения может появиться отек в месте инъекции, исчезающий в течение 7 дней.

3.5 Препарат не рекомендуется применять совместно с другими нестероидными противовоспалительными препаратами, глюкокортикоидами, антикоагулянтами и диуретиками. Не смешивать с другими лекарственными средствами в одном шприце.

3.6 Линил не следует назначать беременным кобылам и жеребят, возраст которых составляет меньше 15 дней.

3.7 Убой животных на мясо допускается не ранее, чем через 4 дня после прекращения применения препарата. Мясо вынужденно убитых животных до истечения указанного срока, может быть использовано в корм плотоядным животным или для производства мясокостной муки.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1 Все работы с препаратом необходимо проводить с соблюдением общепринятых правил личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные для работы с ветеринарными лекарственными средствами.

4.2 Все работы с лекарственным средством необходимо проводить с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты.

4.3 Лицам, проявляющим повышенную чувствительность к кетопрофену, следует избегать прямого контакта с препаратом.

4.4 При попадании препарата на слизистые оболочки, поврежденную кожу промыть большим количеством воды.

5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и об этом сообщают в ГУ «Белорусский государственный ветеринарный центр», г. Минск, ул. Красная, 19^а, тел 290-42-79. Одновременно в ГУ «Белгосветцентр» высылают не менее 3-х невскрытых флаконов препарата данной серии с подробным описанием осложнений.

Изготовитель: «Industrial Veterinaria S.A.»

Barcelona, Spain

Esmeralda, 19, anico, 08950 Esplugues de Llobregat

Tel.: +34-93-373 90 60, Fax: +34-93-373 90 61

