Инструкция рассмотрена и одобрена Ветбиофармсоветом Минсельхозпрода Республики Беларусь
Протокол № 42 от «19» июня 2008 г.

ИНСТРУКЦИЯ
по применению препарата «АГИТА 10 в.г.»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Агита 10 в.г. (Agita 10 w.g.)

1.2. Агита 10 в.г. - инсектицидный препарат, представляющий собой гранулы белого или бежевого цвета.

В 100,0 г препарата содержится 10,0г тиаметоксама и 0,05г Z-9-трикозена.

1.3. Препарат выпускают в полимерной таре по 200,0 и 400,0 г.

1.4. Препарат хранят в сухом, темном, проветриваемом помещении, при температуре от −10°С до +25°С.

Срок годности - 5 лет от даты изготовления, при условии соблюдения правил хранения.

2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1. Тиаметоксам входящий в состав Агита 10 в.г. воздействует на никотиновые рецепторы в постсинаптической мембране двигательных нейронов, тем самым блокируя передачу нервного импульса. Трикозен – половой феромон мух, используется в качестве приманки.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

3.1. Агита 10 в.г. применяют для уничтожения мух в животноводческих помещениях.

3.2. Препарат наносят кистью или методом опрыскивания по следующим схемам: (таблица 1).

Таблица 1

Метод применения	200г	400г
Нанесение кистью	200г/160мл воды = 80 м² поверхности пола или 160-240 м² стены/потолка	400г/320мл воды = 160 м² поверхности пола или 320-480 м² стены/потолка
Опрыскивание	200г/1,6л воды = 40 м² поверхности пола или 80-120 м² стены/потолка	400г/3,2л воды = 80 м² поверхности пола или 160-240 м² стены/потолка

3.3. Порядок приготовления рабочих растворов и применение препарата:

Нанесение кистью: 400 г Агита в.г. размешивают в 320 мл чуть теплой воды (25-30°С) до образования пастообразной консистенции. Обрабатывают не менее 30 точек размером 10х30 см в местах предпочитаемых насекомыми (солнечные стены помещений, оконные рамы, молокопроводы и т.п.). При отсутствии удобных поверхностей для нанесения (деревянные, побеленные поверхности) – обрабатывают полоски полиэтилена или крафт-бумаги, которые прикрепляют к стенам или потолку.

Опрыскивание: 400 г Агита 10 в.г. размешивают в 3,2 л чуть теплой воды (25-31°С). Распыление производят (в местах наиболее предпочитаемых насекомыми) по поверхности пола (80 м²), стен/потолка 160-240 м² соответственно, из которых обрабатывают только 30%.

[illegible] при [illegible] - 6-8 недель, при опрыскивании 4-6 недель.

3.5. Обработку опрыскиванием проводят в отсутствии животных.

3.6. Не обрабатывают грязные, очень пористые, побеленные и свежеокрашенные стены.

3.7. Токсичен для пчел.

3.8. Специфических антидотов нет. При отравлении применяется симптоматическая терапия.

4. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

4.1. При работе с препаратом следует применять средства индивидуальной защиты.

4.2. Не допускать попадания в глаза.

4.3. При попадании препарата на кожу – смыть обильным количеством воды.

4.4. После окончания работы вымыть руки и открытые части тела, сменить одежду.

5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случае неэффективности препарата, его использование прекращают и об этом сообщают в ГУ «Белорусский государственный ветеринарный центр», г. Минск, ул. Красная, 19[a], тел 290-42-79. Одновременно в ГУ «Белгосветцентр» высылают не менее 1-й невскрытой упаковки препарата данной серии с указанием причины.

Изготовитель «Квизда Гмбх» (Австрия).

Ветбиофармсовет
при ГУВ МСХ и П РБ
ОДОБРЕНО
Председатель
Секретарь
Эксперт
19. 06 2002г., протокол №24