Рассмотрено и одобрено
Ветбиофармсоветом,
протокол № 58
от «13» 04 2011 г.

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Родотиума 10 % раствор для инъекций

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Родотиум 10 % раствор для инъекций (Rodotium 10 % solutio pro injectionibus).

1.2. В 1 см^3 препарата содержится 100 мг тиамулина.

1.3. Препарат представляет собой прозрачный раствор от бесцветного до бледно-желтого цвета,

1.4. Препарат выпускают во флаконах из нейтрального стекла по 50 и 100 см^3. Хранят с предосторожностью (список Б) в сухом, защищенном от света месте при температуре от 15°С до 25° С. Срок годности - 2 года со дня изготовления.

2. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1. Тиамулин - полусинтетическое производное плевромутилина, который относится к группе дитерпеновых антибиотиков, получаемых путем биоферментации базидиомицетов Pleurotus mutilis. Тиамулин оказывает бактерицидное действие на грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы, в том числе стафило- и стрептококки, клебсиеллы, эшерихии, бордетеллы, кампилобактеры, пастереллы, сальмонеллы, гемофилюсы, клостридии, коринебактерии, листерии, эризипелотриксы, фузобактерии, бактероиды, а также на микоплазмы и трепонемы.

Особенно важна его высокая активность в отношении микоплазм (*Mycoplasma hyopneumoniae, M. hyorhinis, M. hyosynoviae, M. gallisepticum, M. meleagridis*) и других микроорганизмов.

Механизм действия препарата заключается в нарушении синтеза белка микробной клетки из-за сродства тиамулина к 70S субъединицам бактериальных рибосом.

2.2. После внутримышечного введения тиамулин быстро всасывается в кровь, проникает во многие органы и ткани. Выводится из организма почти полностью метаболизированный с фекалиями, желчью, мочой.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

3.1 Препарат применяют для лечения свиней при дизентерии, энзоотической бронхопневмонии, плевропневмонии, микоплазмозном артрите.

3.2. Препарат назначают внутримышечно.

Для лечения при дизентерии, энтероколите, пролиферативной энтеропатии доза составляет 1,0 см^3 препарата на 12,5 кг массы тела животного однократно. При тяжелых случаях заболевания инъекцию препарата повторяют через 24 часа.

Для лечения энзоотической бронхопневмонии и микоплазмозного артрита доза составляет 1.5 см^3 препарата на 12.5 кг массы тела животного один раз в сутки в течение 3 дней.

Для лечения плевропневмонии, вызванной актинобациллюсом, доза составляет 2,0 см^3 препарата на 12,5 кг массы тела животного один раз в сутки в течение 3 дней.

3.3. Побочные действия. Дисбактериоз, покраснение кожи.

3.4. Противопоказания. Не применять супоросным свиноматкам. Во время лечения, за 7 дней до и 7 дней после применения препарата не давать животным кормовых добавок, содержащих ионофорные антибиотики (салиномицин, монензин, мадурамицин, наразин).

3.5. Убой на мясо допускается не ранее, чем через 10 дней после последнего введения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано на корм плотоядным.

4. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

4.1. При работе с препаратом следует соблюдать общепринятые правила личной гигиены и техники безопасности.

5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1. В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают, и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится.

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» для подтверждения на соответствие нормативным документам.

6. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

6.1 «Биовет АО Пештера», Болгария

Инструкция разработана производителем – «Биовет АО Пештера», Болгария

Ветбиофармсовет
при ГУВ МСХ и П РБ
ОДОБРЕНО
Председатель
Секретарь
Эксперт
«13» 04 2011г., протокол №58