

Рассмотрено и одобрено
Ветбиофармсоветом,
протокол № 57
от «11» 02 2011 г.

Инструкция по применению раствора окситоцина в ветеринарии

1 Общие сведения

1.1 Раствор окситоцина (Solutio oxytocini).

1.2 Раствор окситоцина – раствор для инъекций, содержащий в 1 мл 5 ЕД или 10 ЕД окситоцина - синтетического аналога полипептидного гормона задней доли гипофиза.

1.3 Препарат представляет собой прозрачную бесцветную жидкость со специфическим запахом, без видимых механических включений.

1.4 Препарат выпускают в стеклянных флаконах по 10,0; 20,0; 50,0; 100,0 мл. Хранят по списку Б в сухом, защищенном от света месте при температуре от плюс 2°С до плюс 10°С.

Срок годности 18 месяцев от даты изготовления при условии соблюдения правил хранения.

2 Фармакологические свойства

2.1 Раствор окситоцина повышает тонус и усиливает сокращения гладкой мускулатуры матки, вызывает сокращение миоэпителиальных клеток, окружающих альвеолы молочной железы, стимулируя выделение молока из молочных желез у лактирующих животных.

3 Способ применения

3.1 Раствор окситоцина применяют самкам сельскохозяйственных и домашних животных при слабых потугах во время родов, задержании последа, маточном кровотечении, атонии, гипотонии и воспалении матки, маститах, а также при рефлекторной агалактии.

3.2 Препарат вводят подкожно, внутримышечно, внутривенно (медленно) (табл.А):

Таблица А.

Вид животного	Способы введения и дозы	
	Подкожно или внутримышечно	Внутривенно
Кобылы и коровы, ЕД/100кг	10	7
Свиноматки массой до 200 кг, ЕД/100кг	15	10
Козы и овцы, ЕД/10кг	2,5	2
Собаки, ЕД/10кг	1	0,7
Кошки, ЕД	3	2

3.3 Побочные действия. Рвота, тахикардия, артериальная гипотензия,

преждевременная отслойка плаценты. При передозировке возможно нарушение родовой деятельности.

3.4 Препарат противопоказан беременным животным, при родовспоможении в случаях несоответствия размеров плода и таза, уродств плода, а также при неправильном его положении и членорасположении.

3.5 Продукты животноводства во время и после применения препарата используют без ограничений.

4 Меры личной профилактики

4.1 При работе с препаратом следует соблюдать меры личной гигиены и правила техники безопасности.

5 Порядок предъявления рекламаций



5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают, и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которой он находится.

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» для подтверждения на соответствие нормативных документов.

6 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

6.1 Изготовитель: Частное торговое унитарное предприятие "Биоветпром", 223016, Минский р-н, д. Королищевичи, ул. Коммунистическая, 41 А, к. 1-1.

Инструкция по применению разработана сотрудниками ЧТУП "Биоветпром".

Белорусское республиканское при ГВЦ ВОО и И РБ	
ОДОБРИЛИ	
Председатель	
Секретарь	
Эксперт	
"11" 02 2011 г., протокол № 57	