

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Фармазина 500 водорастворимого порошка для лечения болезней бактериальной и микоплазменной этиологии у свиней, телят и сельскохозяйственной птицы

(организация – разработчик «HUPERHARMA» AD, Болгария)

Торговое наименование лекарственного препарата: Фармазин® 500 водорастворимый порошок (Pharmasin® 500 pulvis hydrosolubilis).

Международное непатентованное наименование действующего вещества: тилозина тартрат.

Лекарственная форма: порошок для орального применения.

Состав: 500 мг тилозина в форме тартрата, а в качестве вспомогательного вещества - лактозы моногидрат до 1 г.

По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой порошок белого или кремового цвета.

Форма выпуска: Фармазин® 500 водорастворимый порошок выпускают расфасованным по 25 г и 200 г в полипропиленовых банках и по 1000 г в пакетах-саше из алюминиевой фольги.

Условия хранения: хранить в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре не выше 25 °С.

Срок годности: 3 года со дня производства. Запрещается применять Фармазин® 500 водорастворимый порошок после истечения срока годности.

Хранить в местах, недоступных для детей.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: Фармазин® 500 водорастворимый порошок относится к антибактериальным препаратам группы макролидов.

Тилозин активен в отношении большинства грамположительных и некоторых грамотрицательных бактерий, в том числе стафилококков, стрептококков, коринебактерий, клостридий, пастерелл, эризипелотрикссов, спирохет, хламидий, трепонем и микоплазм. Механизм действия тилозина заключается в подавлении синтеза белка на рибосомальном уровне.

При пероральном введении тилозин быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта в кровь и проникает практически во все органы и ткани организма. Наиболее высокая концентрация лекарственного препарата достигается в легких, печени, молочных железах и почках. Терапевтическая концентрация антибиотика после однократного применения Фармазина 500 водорастворимый порошок в рекомендованных дозах сохраняется в организме в течение 15-18 часов. Лекарственный препарат выделяется из организма преимущественно с фекалиями, в меньшей степени - с мочой, у лактирующих животных также с молоком.

Фармазин® 500 водорастворимый порошок по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ: Фармазин® 500 водорастворимый порошок применяют с лечебной и лечебно-профилактической целью при

респираторном микоплазмозе птиц, инфекционном синусите индеек, а также для лечения дизентерии и гастроэнтероколитов бактериальной этиологии свиней и бронхопневмоний телят, вызванных чувствительными к тилозину микроорганизмами.

Противопоказанием к применению Фармазина 500 водорастворимого порошка является повышенная индивидуальная чувствительность животных к тилозину. Запрещается применение Фармазина 500 курам-несушкам, яйца которых предназначены в пищу людям. Лекарственный препарат нельзя применять животным с развитым рубцовым пищеварением.

Фармазин[®] 500 водорастворимый порошок применяют животным внутрь с питьевой водой. В период лечения свиньи и птица не должны получать другой питьевой воды, кроме воды с лекарственным препаратом.

Перед применением рекомендованную дозу препарата растворяют в небольшом количестве воды (воду добавляют к порошку), а затем разводят водой до необходимой концентрации.

С лечебно-профилактической целью Фармазин[®] 500 водорастворимый порошок назначают в дозе 1 г на 1 л воды бройлерам в течение 3 суток, индейкам - в течение 5 суток в следующие периоды выращивания:

Вид и группа птиц	Возраст птицы, сутки				
	1-3	1-5	28-29	56-57	140-141
Племенная птица		+	+	+	+
Ремонтный молодняк	+		+		
Индейки	+		+		
Цыплята-бройлеры	+		+		

Свиньям Фармазин[®] 500 водорастворимый порошок назначают в дозе 0,5 г на 1 л воды (или 10 мг/кг массы животного по тилозину) в течение 3-10 дней.

При бронхопневмонии телят лекарственный препарат назначают в суточной дозе 10 мг/кг массы животного по действующему веществу (выпаивают индивидуально с водой или молоком), разделенной на два приема, в течение 7-14 дней.

Симптомы передозировки при применении Фармазина 500 водорастворимого порошка у поросят могут проявляться угнетением, рвотой, нарушением функций желудочно-кишечного тракта.

Особенностей действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не установлено.

Следует избегать пропусков при введении очередной дозы Фармазина 500 водорастворимого порошка, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности препарата. В случае пропуска одной дозы необходимо ввести ее как можно скорее. Далее интервал до следующего введения препарата не изменяется.

При применении лекарственного препарата согласно настоящей инструкции побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. В случае появления аллергических реакций использование лекарственного препарата прекращают и назначают антигистаминные средства. При применении лекарственного препарата у свиней возможны аллергические реакции на тилозин, проявляющиеся в виде легкого отека прямой кишки, эритемы, зуда,

которые быстро проходят после прекращения применения лекарственного препарата.

Фармазин[®] 500 водорастворимый порошок не рекомендуется применять одновременно с другими антибиотиками группы макролидов и с бактерицидными антибактериальными препаратами из-за возможного антагонистического эффекта.

Убой свиней, телят и сельскохозяйственной птицы на мясо, которым применяли лекарственный препарат, разрешается не ранее, чем через 5 суток после прекращения применения Фармазина 500 водорастворимого порошка. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано в корм пушным зверям.

Организация-производитель: АО «Биовет» («Biovet» AD); 4550 Болгария, г. Пештера, ул. Петр Раков, 39.

Адрес представительства АО «ХЮВЕФАРМА» (Болгария) в г. Москва: 115191, г. Москва, 4-й Рощинский пр., 19.