

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Пулкокса С 20% и 40% для профилактики кокцидиоза у цыплят-бройлеров, ремонтного молодняка кур и индеек

(организация – разработчик «HUPERHARMA» AD, Болгария)

Торговое наименование лекарственного препарата: Пулкокс[®] С 20% и 40% (Poulcox[®] С 20% and 40%).

Международное непатентованное наименование: монензин.

Лекарственная форма: гранулы для орального применения.

Состав: монензин в форме натриевой соли соответственно 200 мг и 400 мг, а также вспомогательные вещества.

По внешнему виду препарат представляет собой гранулы от бежевого до коричневого цвета.

Форма выпуска: Пулкокс[®] С 20% и 40% выпускают расфасованным по 20 кг и 25 кг.

Условия хранения: хранить в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0 °С до 25 °С.

Срок годности: 2 года с даты производства. Запрещается применение Пулкокса С 20% и 40% по истечении срока годности.

Хранить в местах, недоступных для детей.

Фармакологические свойства: Пулкокс[®] С 20% и 40% относится к антикокцидийным лекарственным препаратам группы полиэфирных ионофорных антибиотиков.

Монензин натрия, входящий в состав лекарственного препарата, обладает широким спектром кокцидиостатического действия, активен в отношении всех видов кокцидий (эймерий), паразитирующих у птиц, включая *E. necatrix*, *E. tenella*, *E. acervulina*, *E. brunetti*, *E. maxima*, *E. mivati*, *E. praecox*, *E. gallopavonis*, *E. meleagridis*, *E. adenoids*, *E. dispersa*. Механизм действия монензина связан с нарушением переноса катионов натрия и калия у неполовозрелых форм кокцидий, что приводит к их гибели на стадии шизогонии.

При пероральном введении Пулкокса С 20% и 40% монензин практически не всасывается в желудочно-кишечном тракте и оказывает свое действие на слизистой и подслизистой оболочках. Выводится из организма птиц, главным образом, в неизменном виде с пометом.

Пулкокс[®] С 20% и 40% по степени воздействия на организм согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу опасности (вещества умеренно опасные).

Порядок применения : Пулкокс[®] С 20% и 40% назначают с целью профилактики кокцидиоза цыплятам-бройлерам, ремонтному молодняку кур и индейкам.

Запрещается применение Пулкокса[®] С 20% и 40% курам-несушкам, в связи с накоплением монензина в яйцах, индейкам и ремонтному молодняку кур старше 16-недельного возраста, а также племенной птице и животным других видов.

В рацион цыплят-бройлеров и ремонтного молодняка кур Пуллокс® С 20% и 40% вводят соответственно в дозе 500 г и 250 г на 1 тонну корма (100 мг монензина натрия на 1 кг корма) в рацион индеек – в дозе 300 г и 150 г на 1 тонну корма (60 мг монензина натрия на 1 кг корма) и применяют:

- цыплятам-бройлерам с первого дня жизни в течение всего периода выращивания, исключая из рациона за 5 дней до убоя;
- ремонтному молодняку кур с первого дня жизни до 16-недельного возраста;
- индейкам с первого дня жизни до 16-недельного возраста.

Для обеспечения равномерного распределения суточную дозу лекарственного препарата тщательно смешивают с небольшим количеством комбикорма, а затем вносят при тщательном перемешивании в корм, рассчитанный на потребление птицей в течение суток.

При передозировке у птиц может наблюдаться снижение аппетита, уменьшение потребления воды и потеря массы.

Особенностей действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не установлено.

Следует избегать пропусков при введении очередной дозы Пуллокса® С 20% и 40%, так как это может привести к снижению эффективности. В случае пропуска очередной дозы применение препарата следует возобновить в той же дозировке и по той же схеме.

При применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у птиц, как правило, не наблюдается. Не допускается использование Пуллокса С 20% и 40% одновременно с другими антикокцидийными средствами. Запрещается применение Пуллокса С 20% и 40% совместно с тиамулином, а также за 7 дней до начала и 7 дней после окончания его применения.

Убой птиц на мясо разрешается не ранее, чем через 5 суток после последнего применения Пуллокса С 20% и 40%. Мясо птиц, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано в корм пушным зверям.

Организация-производитель: АО «Биовет» («Biovet» AD); Болгария, 4550, г. Пештера, ул. Петра Ракова, 39.

Адрес представительства АО «ХЮВЕФАРМА» (Болгария) в г. Москва: 115191, г. Москва, 4-й Рощинский пр., 19.