

Рассмотрено и одобрено
Ветбиофармсоветом Минсельхозпрода,
протокол
№ 64 от 13 ноября 2012 г.

Инструкция по применению препарата Метрамаст Форте

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Метрамаст Форте форте (Tetramastum forte).

1.2 Метрамаст Форте - комплексный антимикробный препарат, содержащий окситетрациклин, бацитрацин, преднизолон, неомицин и основу.

1 шприц содержит:

окситетрациклина	- 200 мг;
бацитрацина	- 2000 ЕД;
неомицина	- 250 мг;
преднизолона	- 10 мг;
основы	- до 8 г.

1.3 Препарат представляет собой однородную гелеобразную массу от светло-желтого до светло-коричневого цвета. Допускается расслоение при хранении.

1.4 Препарат выпускают по 8,0 г в пластиковых шприцах - инъекторах, закрытых колпачками. Препарат хранят (по списку Б) в сухом, защищенном от света месте, при температуре от плюс 2°С до плюс 25°С.

Срок годности препарата - 24 месяца при указанных условиях хранения и транспортирования.

2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 Комбинация компонентов, входящих в состав препарата, обеспечивает широкий спектр антимикробного действия по отношению к основным возбудителям мастита (*E.coli*, *Strept.uberis*, *Staph.aureus*). Антибиотики действуют последовательно на разные стадии развития бактерии. Благодаря этому препарат сохраняет активность даже в отношении бактерий, резистентных к компонентам в отдельности. Кортикостероидный компонент преднизолон позволяет максимально снизить воспалительную реакцию и отечность тканей вымени, количество соматических клеток в молоке и быстро восстановить молочную продуктивность.

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

3.1 Препарат предназначен для лечения коров, больных маститом в лактационный период.

3.2 Для лечения мастита у коров. Перед введением препарата содержимое больной четверти вымени выдаивается, сосок вымени обрабатывается антисептиками, разрешенными для этой цели. Затем снимают колпачок с наконечника шприца – инъектора и вводят его в сосковый канал, выдавливая содержимое в пораженную долю вымени. После этого наконечник извлекают, пережимают верхушку соска и проводят массаж доли вымени снизу – вверх. При необходимости повторить лечение через 24 часа.

Контроль эффективности лечения маститов у коров проводят через 3 - 5 дней после последнего введения препарата быстрым маститным тестом, используя диагностический препарат и молочно – контрольную пластинку.

3.3 Побочное действие при использовании препарата не установлено.

3.4 Противопоказания. Не допускается применение препарата при индивидуальной повышенной чувствительности к окситетрациклину, бацитрацину, преднизолону и неомицину.

3.5 Молоко от коров из больных четвертей вымени, подвергающихся лечению и до истечения 3 суток после последнего введения препарата, запрещается использовать для пищевых и кормовых целей. Его направляют на утилизацию. Из здоровых четвертей – используют в корм животных после кипячения. Мясо животных, убитых в период лечения, разрешается использовать не ранее, чем через 3 суток после последнего введения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано на корм плотоядным.

4 МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

4.1 При работе с препаратом должны выполняться общие требования по технике безопасности и личной гигиены.

5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которой он находится. Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение "Белорусский государственный ветеринарный центр" для подтверждения на соответствия нормативных документов.

6 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

6.1 Изготовитель: Частное торговое унитарное предприятие "Биоветпром", 223016, Минский р-н, д. Королищевичи, ул. Коммунистическая, 41 А, к. 1-1.

Инструкция по применению разработана сотрудниками УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» и ЧТУП "Биоветпром" (Красочко П.П., Яромчиком Я.П., Клеповым С.А.).

